



**ANÁLISIS COMPARADO DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN MUJERES  
MEXICANAS CON Y SIN PREECLAMPSIA DE TRES ESTADOS \* PROYECTO  
MULTICÉNTRICO PAPIIT IN308814 UNAM: 081**

**Autores:**

MARÍA DE LOS ÁNGELES TORRES LAGUNAS - Profesora de Carrera de Tiempo Completo - Doctora en Ciencias de Enfermería - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Universidad Nacional Autónoma de México - angelestorres@comunidad.unam.com  
ELSY GUADALUPE VEGA MORALES - Profesora Investigadora de Medio Tiempo - Doctora en Ciencias de Enfermería - Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán. - elsygpevega@gmail.com  
ILSIA VINALAY CARRILLO - Profesora de Tiempo Completo - Doctora en Ciencias de Enfermería - FE Universidad Veracruzana - ils\_09@hotmail.com  
GUILLERMINA ARENAS MONTAÑO - Profesora de Tiempo Completo - Doctoranda en Salud Pública - Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Autónoma de México. - guillearenasm@gmail.com  
ELMY RODRÍGUEZ ALONZO - Profesora de Tiempo Completo - MSC - Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán. - elsygpevega@gmail.com  
ELOÍSA BEATRIZ DEL SOCORRO PUCH-KU - Profesora de Tiempo Completo - MCE - Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán. - elsygpevega@gmail.com

**Introdução:** Los factores psicosociales han demostrado fuerza de asociación con la preeclampsia. En este estudio se identifican los factores de riesgo psicosociales en mujeres mexicanas puérperas con y sin preeclampsia de los Estados de México, Yucatán y Veracruz.

**Objetivos:** Hacer un análisis comparativo de los factores psicosociales identificados en tres estados de la República Mexicana para proponer una intervención integral de Enfermería.

**Resultados:** Las variables se analizaron con Kruskal Wallis, las categóricas con frecuencias y el riesgo por razón de Momios (OR) con IC 95%. El análisis reveló violencia leve en los 3 estados, el riesgo 3-4 veces más cuando hay depresión (OR:3.53;IC95%:1.135-10.97) y (OR:3.67;IC95%:1.23-10.89); Para el estado de Veracruz, la sintomatología depresiva fue un riesgo 7 veces mayor que tuvieron menos de 5 consultas prenatales (OR:7.42;IC 95%: 2.85-19.33)

**Conclusão:** Se identificó la asociación de sintomatología depresiva, depresión, violencia y número de consultas prenatales como factores psicosociales para preeclampsia. Se propone implementar intervenciones integrales de enfermería para prevenir esta enfermedad.

**Descritores:** Preeclampsia | Factores de Riesgo | Estudios de Casos

